

Rutin för total parenteral nutrition (infusion)

Inledning

Rutin för total parenteral nutritioners infusion gäller för sjuksköterskor och läkare inom vård- och omsorgsboenden och korttidsboendeför äldre där det finns tillgång till sjuksköterska och LSS boendeenheter samt för socialpsykiatrins boendeenheter inom Tyresö kommun.

Syfte

Syfte och mål med denna rutin är att säkerställa en god och patientsäker vård. Ansvar och arbetssätt av total parenteral infusion sker huvudsakligen under vardagar mellan klockan 8:30 – 16:00.

Läkaren har möjlighet att övrig tid ordinera parenteral infusion i specifika och vid akuta tillstånd. Sjuksköterskan verkställer ordinationen.

Läkaren ansvarar för att:

- Parenterala infusioner i första hand sker vardagar mellan klockan 08:30 - 16:00
- Infusionen ordineras i perifert insatt central kateter (PICC) är en centralvenös infart.
- Infusionen ordineras i perifert insatt central kateter (SVP) port a cath subkutan venport.
- Infusionen ordineras i perifer venkateter (PVK) eller motsvarande.

Sjuksköterskan ansvarar för att:

- Tillsammans med läkaren planera och utföra parenteral infusion
- Påbörja verkställighet av ordination snarast under vardagar, 8:30 – 16:00
- Inspektera insticksställets utseende, kateterns externa längd, tillämpa basala hygienrutiner, förbereda omläggingsmaterial, förbereda infusioner, säkerställa med regelbundna kontroller och dagligen ta ställning av fortsatt behov.

Perifer venkateter - PVK

Använda PVK med stickskydd. Avlägsna när den inte längre behövs. För att minska risken för komplikationer ska PVK ligga inne, kortast möjliga tid.

Vid uppkommen vårdskada rapportera/skriva en avvikelserapport

I vårdhandboken finns vidare information:

<https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/nutrition/nutrition-parenteral/oversikt/>